

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO FISIOTERAPIA – HCPETROLINA

PRONAÇÃO DO PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA PRONAÇÃO NO LEITO

ORIENTAÇÕES:

- EQUIPE TREINADA, COMPOSTA POR NO MÍNIMO TRÊS PROFISSIONAIS, SENDO CINCO O IDEAL;
- PAUSAR DIETA E ABRIR SONDA NASOENTERRAL 2 HORAS ANTES DO PROCEDIMENTO;
- PROVIDENCIAR COXINS PARA APOIO DA FACE, TORAX, PELVE, PUNHO E REGIÃO ANTERIOR DAS PERNAS;
- APROXIMAR CARRO DE PARADA COM BANDEJA DE INTUBAÇÃO;
- PROVER CUIDADOS OCULARES E PARA PELE;
- FIXAR ADEQUADAMENTE OS DISPOSITIVOS INVASIVOS E CURATIVOS;
- ASPIRAR VIAS AÉREAS;
- VERIFICAR FIXAÇÃO, COMISSURA LABIAL E PRESSÃO DO CUFF DO TOT;
- PRÉ-OXIGENAR COM FIO2 100% POR 10 MINUTOS;
- AJUSTAR ANALGESIA, SEDAÇÃO E BLOQUEIO NEUROMUSCULAR;
- DESCONECTAR E FECHAR SONDA NASOENTERRAL, CLAMPEAR SONDAS, DRENOS E POSICIONA-LOS ENTRE AS PENAS OU BRAÇOS;
- COLOCAR CABECEIRA EM POSIÇÃO PLANA E ALINHAR MEMBROS;
- COLOCAR COXINS DE PELVE E TORAX;
- PAUSAR INFUSÕES E DESCONECTAR CATETERES;
- REALIZAR A TÉCNICA DE ENVELOPE;
- REALIZAR O GIRO EM TRÊS MOMENTOS: DESLOCAMENTO LATERAL PARA O LADO CONTRÁRIO DO VENTILADOR, LATERALIZAÇÃO E POSIÇÃO PRONA;
- CHECAR POSICIONAMENTO DO TOT, COMISSURA LABIAL E PRESSÃO DO BALONETE;
- CHECAR POSIÇÃO DOS COXINS DA FACE, MÃO E REGIÃO ANTERIOR DAS PERNAS;
- MANTER DA CABECEIRA DA CAMA ELEVADA A 30 A 45 GRAUS;
- MANTER O MOMEMBO SUPERIOR ELEVADO EM POSIÇÃO DE NADADOR, COM ALTERNÂNCIA A CADA 2 HORAS;
- REINICIAR DROGAS VENOSAS;
- REINICIAR NUTRIÇÃO ENTERAL 2 HORAS APÓS PRONAÇÃO.

